

ANTIBIOTIKA VS OBAT LAIN

Obat Maag (Radang Lambung)

Obat yang mengandung aluminum Hidroksida($\text{Al}(\text{OH})_3$), magnesium hidroksida ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) atau sukralfat dapat menurunkan efektivitas antibiotika levofloxacin dan azytromycin sehingga dianjurkan untuk memberi selang 2 jam pemberian masing-masing obat

Obat Radang

Obat seperti deksametason dan methylprednisolon jika diberikan bersama antibiotika ciprofloxacin/levofloxacin dapat meningkatkan potensi efek samping antibiotika yaituradang pada otot/nyeri otot terutama pada orang tua

Contact :

INSTALASI FARMASI
RSUP SANGLAH

Jalan Diponegoro Depansar
Bali, 80113
0361-227911

AYO CEGAH INTERAKSI OBAT !!

- Komunikasikanlah kepada dokter maupun apoteker anda jika menggunakan obat bersama dengan obat lain ataupun obat vitamin, suplemen dan obat herbal
- Pastikan dokter mengetahui obat-obatan yang rutin anda gunakan untuk mencegah terjadinya interaksi obat
- Ikuti aturan minum sesuai informasi yang diberikan seperti mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu saat mengkonsumsi obat tersebut
- Hindari menggunakan obat yang diresepkan orang lain
- Hindari penggunaan obat herbal dengan obat lain karena interaksinya belum diketahui

sumber: Instalasi Farmasi RSUP Sanglah Denpasar



INTERAKSI OBAT ANTIBIOTIKA

KENALI INTERAKSI PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA DENGAN MAKANAN DAN OBAT-OBATAN LAIN





INTERAKSI OBAT



Apa yang kita konsumsi (makanan, minuman, ataupun obat herbal dan obat lainnya) dapat mempengaruhi efektivitas suatu pengobatan

Hal yang dapat terjadi Akibat Interaksi Obat :

- Menurunkan efektivitas obat yang sedang kita konsumsi
- Meningkatkan efektivitas obat yang sedang kita konsumsi
- Meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping obat
- Menimbulkan efek yang tidak terduga dari konsumsi obat tersebut

ANTIBIOTIKA VS MAKANAN

Produk Olahan Susu dan Jus Jeruk

Golongan Quinolon (Ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin); serta Golongan Tetracycline (Doxycycline dan Tetracycline) dapat menurunkan efektivitasnya, jika dikonsumsi bersama dengan jus jeruk atau produk olahan susu seperti keju, susu, yogurt. Dianjurkan tidak mengonsumsi makanan tersebut bersamaan dengan obat di atas

Kafein

Ciprofloxacin dapat meningkatkan efek kafein, sehingga disarankan menurunkan konsumsi minuman berkafein seperti kopi saat mengonsumsi obat ini

Alkohol

Mengonsumsi alkohol bersama obat metronidazol dapat mengakibatkan efek pusing, mual muntah dan kram perut.

Makanan pada Umumnya

Levofloxacin dan ampicilin efeknya menurun karena makanan. Sebaiknya obat diminum satu jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan

APA ITU ANTIBIOTIKA?

Obat yang digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan bakteri dan bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri

CARA PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA YANG TEPAT?

- Gunakan antibiotika jika hanya diresepkan dokter
- Minum sampai habis antibiotika yang diberikan, meskipun merasa sudah sembuh
- Jangan menggunakan antibiotika untuk mengobati infeksi virus seperti batuk dan pilek, karena antibiotika untuk membunuh bakteri