

## FAKTOR RISIKO BBLR

1. Infeksi selama kehamilan
2. Tidak mendapatkan berat badan yang cukup selama kehamilan
3. Kehamilan sebelumnya dengan bayi berat lahir rendah
4. Merokok
5. Usia ibu saat hamil < 17 tahun atau > 35 tahun



## DEFINISI

**BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)**, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan berat lahir < 2500 gram.

**BBLR disebabkan karena hambatan pertumbuhan intrauterine, prematuritas atau kombinasi keduanya**



Scan the QR code to get more information about health services.

Sumber : Instalasi rawat inap B RSUP PROF Dr.I.G.N.G NGOERAH DENPASAR

## BERAT BADAN LAHIR RENDAH



## KAPAN BAYI DENGAN BBLR HARUS SEGERA DIPERIKSA ?

- Bayi menjadi lebih lemas, menolak untuk minum
- Kejang
- Tali pusat berdarah, kemerahan, dan berbau
- Bayi demam
- Tampak kuning
- Bayi merintih tidak menangis seperti biasanya

**TERIMA KASIH  
SEMOGA ANAK ANDA SEHAT  
SELALU**

## PERAWATAN BAYI BBLR DI RUMAH



- JAGA AGAR TUBUR BAYI TETAP HANGAT
- PERIKSA POPOK SECARA RUTIN DAN SEGERA GATI BILA PENUH
- RAWAT DENGAN METODE KANGAROO CARE (AYAH ATAU BUNDA MEMELUK BAYI SETIAP SAAT DENGAN KULIT BAYI TERKENA KULIT AYAH ATAU BUNDANYA LALU KEDUANYA DISELIMUTI DENGAN PAKAIAN TEBAL DAN LEMBUT)
- ASI DIBERIKAN SESUAI KEMAMPUAN TETAPI SERING
- JAUHKAN BAYI DARI ORANG SAKIT

## PENCEGAHAN

**Perawatan Prenatal** secara teratur merupakan cara terbaik untuk mencegah kelahiran premature dan bayi dengan berat lahir rendah

**Melakukan diet sehat** selama kehamilan ini akan membantu ibu selama masa kehamilan dengan penambahan berat badan yang cukup untuk membantu bayi tumbuh dan ibu tetap sehat